

第2類医薬品

販売名:ピタスセトローチ
特徴 ●腔内殺菌成分・セ
チルピリジニウム塩化物水
和物を配合しており、のどの
炎症によるのどの痛みは、
れを抑えます。●鎮咳成分・
フェノールフタリン酸デキ
ストロメルフアankan咳中枢
にはたらい、つらい咳を抑
えます。

▲ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと　本剤又は本剤の成分によりアレルギー一症状を起したことがある人。
2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと　他の鎮痛薬（アセチルサリシ酸塩、抗炎症性ステロイド）、他種の鎮咳薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含むもの、内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 使用後、果物又は機械類の運動操作をしないこと（眠気等があらわれることがある。）

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ジョック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。低気

4. 5～6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

S231005 副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931

使用期限 製造番号

PITAS -ピタス-

使用に際してはこの説明書をよく読み、本剤とともに保管してください。

[保管及び取扱い上の注意]

(1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。
(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
(4)アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【効能・効果】せき、たん、のどの炎症による
のどの痛み、のどのはれ、のどのあれ、のどの
不快感、声がれ

【用法・用量】次の量を口中に含み、がまず
にゆっくり溶かして使用すること。

年 齢	1回量	1日使用回数	使用間隔
成人(15歳以上)	1個	6回	2時間以上
15歳未満	使用しないこと。		


＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) かんんだり、のみこんだりしないこと。

[成分]6個(1日使用量)中

成 分	含 量
フェノールフタリン酸デキストロメトリアン	60mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	140mg
セザルピリジニウム塩化物水和物	6mg

添加物:ビドロキシプロピルセルロース、ポリブタレン、マクロゴール、*l*-メントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、ショ糖脂肪酸エステル、スクラロース、銅クロロフィリンNa、香料



製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都二代田区神日錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>



ピタスセキトローチ


第2類医薬品

セルフメディケーション


对象除税



中
動
移



母 體 的



母
加
銀

12個入り