

2013年1月(記載要領変更に伴う改訂)

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ側面およびチューブ底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

デリケートゾーンのかゆみ・かぶれに

非ステロイド剤



鎮痒消炎薬 第2類医薬品

販売名: フェミニーナ軟膏S

特徴

- ①有効成分リドカインおよびジフェンヒドラミン塩酸塩がしつこいかゆみや炎症を鎮めます
- ②殺菌成分イソプロピルメチルフェノールが雑菌の発生を抑えます
- ③低刺激性で肌にやさしくしみません
- ④親水性クリームなのでべたつきません

△ 使用上の注意

本剤はカンジダ症の治療薬ではありません。フェミニーナ腔カンジダ錠などカンジダ治療薬と併用しないでください

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと: カンジダ症の人
2. 次の部位には使用しないこと: 目の周囲、粘膜など



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 湿疹やただれのひどい人 (5) 乳幼児
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能・効果

かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ

用法・用量

1日数回、患部に適量を塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること
- 同じ部位に他の外用剤との併用は避けること
- 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと

(裏面につづく)

リドカイン	2.0g	(局所麻酔成分) かゆみを素早く鎮めます
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	(抗ヒスタミン成分) かゆみの発生を抑えます
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	(殺菌成分) 雑菌の発生を抑えます
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	(ビタミンE) 血行を促進して肌の新陳代謝を高めます

添加物として、エドト酸Na、グリセリン、パラベン、ベヘニルアルコール、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸グリセリン、ラノリンアルコール、流動パラフィンを含む

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

……こんな症状にお使いください……

●生理時のかゆみ

ナブキンやタンポンのひも、経血の刺激によって引き起こされるかゆみに

●おりものによるかゆみ

●汗ムレによるかゆみ

●下着かぶれ

下着やストッキングなどの繊維刺激によるかゆみ、かぶれに

●陰部周辺部のかゆみ

●その他の炎症・かゆみ・かぶれなど

上記の症状に、フェミニーナ軟膏Sで素早くかゆみを鎮めましょう

ご注意

カンジダ症、トリコモナス症は、外陰部のかゆみに加え、おりものの異常を伴う場合が多いです。おりものの異常や、フェミニーナ軟膏Sを5～6日間使用しても症状の改善が見られない場合は必ず医師にご相談ください

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

 発売元
小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-410

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎0120-5884-01

受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元
小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

10124341