

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

特 長

●ロイヒつば膏TMクールは、有効成分のサリチル酸メチル、*l*-メントールなどの鎮痛消炎成分が肩こり、腰・関節・筋肉のつらい痛みにすぐれた効果をあらわします。●ひとりで簡単に貼れる、目立たない小型の丸形プラスターです。●伸縮性があるので、肌によくフィットします。

⚠使用上の注意

❌【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。

①目の周囲、粘膜等。②湿疹、かぶれ、キズぐち。



【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

①本人又は家族がアレルギー体質の人。

②薬などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。


2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、ただちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、色素沈着、皮膚はく離等


3. 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【貼り方の参考例】


下図を参考に、指で押してみても痛みを感じる場所、こりがあるところを中心に貼ってください。




例1 肩こり



例2 肩こり



例3 肩こり・腰痛



例4 腰痛



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931

NB25E04

ぎけくち

販売名

ロイヒつば膏クール

第3類医薬品

品番 RC156

効能・効果

肩こり、腰痛、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲(うちみ)、捻挫

用法・用量

1 日数回患部に貼付する。

◆用法・用量に関連する注意

- ① 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ② 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側に1cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が発現しないことを確かめてから使用してください。
- ③ 皮膚の弱い人は、同じところには続けて貼らないでください。
- ④ 汗などをよく拭きとり、患部をきれいにしてからお貼りください。
- ⑤ 外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分・分量

膏体100g中	サリチル酸メチル	6.7g
	<i>l</i> -メントール	6.7g
	<i>dl</i> -カンフル	3.3g

添加物として、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、テルペン樹脂、水素添加ロジングリセリンエステル、流動パラフィン、BHT、香料、その他 1 成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- ① 小児の手のとどこない所に保管してください。
- ② 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ③ 誤用をさけ、品質を保持するため、開封後はチャックを合わせ閉じて、袋の口を折りまげ、箱に入れて保管してください。
- ④ 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

<包装> 直径 2.8cm・・・156枚

本品についてのお問い合わせは、
お買い求めの販売店、又は下記の
「お客様相談室」にお願いいたします。

ニチバン株式会社

〒102-8811 東京都千代田区麹町5-1
<https://www.nichiban.co.jp/>
お客様相談室 電話 0120-377-218
受付時間：9:00～12:00、
13:00～16:00(土、日、祝日を除く)



個箱



製品袋

MADE IN JAPAN 日本製 TM: trademark

製造番号

使用期限