

眼精疲労、肩こり、腰痛の症状の緩和

エスファイトゴールドDX

1日1回 ビタミンB1・B6・B12製剤、ビタミンE配合

ESFIGHT GOLD-DX

■エスファイトゴールドDXは…

筋肉や神経の機能維持に必須のビタミンB1・B6・B12を配合しています。さらに、これらの働きをバックアップするビタミンEとニコチン酸アミドの配合で、放っておけない目・肩・腰のつらい症状にすぐれた効果を発揮します。エスファイトゴールドDXに配合されているビスベンチアミンは、ビタミンB1を消化管からの吸収・組織への移行性にすぐれたかたちにした誘導体です。



眼精疲労に



肩こりに



腰痛に

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
医師の治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、胃部不快感

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。
- 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談してください
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、軟便、下痢

■ 効能・効果

- 次の諸症状の緩和：
眼精疲労、筋肉痛・関節痛（肩こり、腰痛、五十肩など）、神経痛、手足のしびれ
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください」
- 次の場合のビタミンB1・B6・B12の補給：
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

■ 用法・用量

次の1回量を1日1回服用します。

年 齢	成人(15才以上)	11才～14才	5才～10才	5才未満
1回量	2～3錠	1～2錠	1錠	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

○小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分とはたらき

成分（3錠中）	はたらき
ビスベンチアミン （ビタミンB ₁ 誘導体） 100mg	●ビタミンB ₁ ・B ₆ ・B ₁₂ は、筋肉や神経の機能維持に必須であり、エネルギーの産生をうながしたり、神経の伝達をたすけたりすることによって、神経や筋肉の疲れからくる目・肩・腰の症状をやわらげていきます。
ピリドキシン塩酸塩 （ビタミンB ₆ ） 100mg	
シアノコバラミン （ビタミンB ₁₂ ） 1,500μg	
トコフェロールコハク酸 エステルカルシウム （ビタミンEコハク酸エステルカルシウム） 103.58mg （コハク酸d δ - α -トコフェロールとして100mg）	●ビタミンEは、血管を丈夫にし体のすみずみに血液をいきわたらせます。疲れがたまった筋肉や神経組織に酸素や栄養を補給する一方、老廃物の除去をうながし、ビタミンB ₁ ・B ₆ ・B ₁₂ の働きをたすけます。
ニコチン酸アミド 60mg	●ニコチン酸アミドは、ビタミンB ₁ やB ₆ などと協力し、筋肉や神経組織の活動に必要なエネルギーの産生をうながす働きがあります。

添加物として、CMC-Ca、無水ケイ酸、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、D-マンニトール、アラビアゴム、カオリン、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、バレイショデンプン、ビタミンB₂を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にビンのフタをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱うと、糖衣にムラができたり、変色したりすることがあります。
- (5)ビンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル ☎ 0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）