

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



食物繊維の働きで自然に出したい方に

コーラックファイバーplus



販売名: コーラックファイバーplus **第3類医薬品** 〈便秘薬〉

- ◆コーラックファイバー plusは、腸に集めた水と膨らんだ食物繊維が便の力さを増やします。自然に近い便意でふっくらスムーズなお通じを促します。
- ◆プラントゴ・オバタ種皮末：膨らんだ食物繊維が便の力さを増して、自然に近い便意を呼び起こします。
- ◆水酸化マグネシウム：腸に水を集めて便を柔らかくします。



使用上の注意



❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- ① 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)



相談すること



- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
(4) 次の診断を受けた人。
腎臓病
 - ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------|
| 消化器 | はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 |
- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
 - ④ 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

用法・用量

次の量をコップ1杯の水又はお湯に加え、よくかきまぜ直ちに服用してください。

年 令	1 回 量	服用回数
15才以上(大人)	1～2包  ～ 	1日3回食前(又は食間あるいは食後) ただし、初回は最小量を用い、便通の 具合や状態をみながら少しずつ増量 又は減量してください。
11才～14才	2/3～4/3包  ～ 	
7才～10才	1/2～1包  ～ 	
3才～6才	1/3～2/3包  ～ 	
3才未満	服用しないこと	

[注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)そのまま直接飲まないでください。必ず水又はお湯に加え、よくかきまぜて服用してください。
- (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。



成 分

1包(1.75g)中

成 分	分 量	はたらき
プラントゴ・オバタ種皮末	700mg	便の力を増して自然に近い便意を呼び起こす。
水酸化マグネシウム	210mg	腸に水を集めて、便を柔らかくする。

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、クエン酸、ビタミンC、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、アセスルファムK、無水ケイ酸、香料

[注意]

本剤は植物由来の成分を配合しておりますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、なるべくはやく服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

発売元 大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://brand.taisho.co.jp/colac/>

製造販売元 新新薬品工業株式会社
富山県富山市今市324番地

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)