

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

糖類ゼロ

リポビタンZERO

販売名：リポビタンゼロ

指定医薬部外品

【使用上の注意】

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能】

- ★疲労の回復・予防
- ★体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- ★日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：肩・首・腰又は膝の不調、疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ、目の疲れ
- ★虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防：骨又は歯の衰え
- ★病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

【用法・用量】

成人（15才以上）1日1回1本（100mL）を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

【注意】

定められた用法・用量を厳守してください。（他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください）

【成 分】 100mL 中

タウリン	1000mg	ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	5mg
カルニチン塩化物	30mg	ニコチン酸アミド	20mg
チアミン硝化物（ビタミンB ₁ ）	5mg	無水カフェイン	50mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB ₂ ）	5mg		

添加物：D-ソルビトール、エリスリトール、塩化Na、アセスルファムK、精製ステビア抽出物、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、没食子酸プロピル、安息香酸Na、香料、グリセリン、バニリン

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のビタミンB₂によるもので、ご心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

1本あたり 16kcal

大正製薬株式会社¹¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号
お客様119番室 電話 03-3985-1800

大正製薬  株式会社

—本文は、直接ラベルに記載されている事項です—